

(19) Korea Intellectual Property Office (KR)
(12) Patent Gazette (A)

(51) Int. Cl.⁶
C07D 239/10

(11) Publication No. : 2001-0048569
(43) Publication Date : June 15, 2001

(21) Application No. : 10-1999-0053294
(22) Filing Date : November 27, 1999

(71) Applicant : **DONGWHA PHARMACEUT. CO., LTD.**

Kyu Un Whang
5, Soonwha-dong, Joong-gu, Seoul, Korea

(72) Inventor(s) Sung Joon Yoon

1420-11, Shinlim 5-dong, Gwanak-gu, Seoul, Korea

Sang Wook Lee

Kumho Apt. #105-1601, 149-1, Bakdal 2-dong,

Manan-gu, Anyang-shi, Kyeonggi-do, Korea

Nam Du Kim

Hyundai 1st Apt. #102-306, 628, Okryeon-dong,

Yeonsu-gu, Incheon, Korea

Yong Kyun Park

Block Seohae Apt. #103-1804, 138, Eunhaeng district,

Daeya-dong, Shiheung-shi, Kyeonggi-do, Korea

Geun Hyung Lee

707-298, Anyang 5-dong, Manan-gu, Anyang-shi,

Kyeonggi-do, Korea

Jong Woo Kim

305-85, Bisan 3-dong, Dongan-gu, Anyang-shi,

Kyeonggi-do, Korea

Sang Jin Park

Kumho Apt. #316, 44, Cheonho 1-dong,

Gangdong-gu, Seoul, Korea

Hee Jeong Park

68-79, Bakdal-dong, Manan-gu, Anyang-shi,

Kyeonggi-do, Korea

Whan Bong Jang

Poong Jeon Villa #B-101, 479, Bupyeong 5-dong,

Bupyeong -gu, Incheon, Korea

(74) Agent(s) Won Hee Lee

Request for Examination : Not Filed


[Title of Invention]

Novel 5-pyrimidinecarboxamide derivatives and pharmaceutical compositions thereof

[Abstract]

The present invention relates to a novel 5-pyrimidine carboxamide derivative, a process for the preparation thereof and a pharmaceutical composition containing it. Specifically, 5-pyrimidinecarboxamide derivative represented by the following formula, non-nucleic acid based compound, exhibits the effects of inhibiting HBV (Hepatitis B Virus) proliferation as well as HIV (Human Immunodeficiency Virus) proliferation, and thus, it can be used as a agent for preventing and treating Hepatitis B and acquired immune deficiency syndrome.

[Formula I]



Wherein R₁ and R₂ are as described in the specification

공개특허특2001-0048569

(19)대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)(51) Int. Cl. ⁶
C07D 239/10(11) 공개번호 특2001-0048569
(43) 공개일자 2001년06월15일

(21) 출원번호 10-1999-0053294

(22) 출원일자 1999년11월27일

(71) 출원인 동화약품공업 주식회사 황규언
서울 중구 순화동 5번지(72) 발명자 윤성준
서울특별시관악구신림5동1420-11
이상욱
경기도안양시만안구박달2동149-1금호아파트105동1601호
김남두
인천광역시연수구육련동628현대1차102동306호
박용균
경기도시흥시대아동은행지구138블럭서해아파트103동1804호
이근형
경기도안양시만안구안양5동707-298
김종우
경기도안양시동안구비산3동305-85
박상진
서울특별시강동구천호1동44금호아파트316호
박희정
경기도안양시만안구박달동68-79호
장환봉
인천광역시부평구부평5동479번지풍전주택B동101호

(74) 대리인 이원희


심사청구 : 없음

(54) 신규의 5-피리미딘카르복스아미드 유도체 및 그를포함하는 약학적 조성물

요약

본 발명은 신규의 5-피리미딘카르복스아미드 유도체, 그의 제조방법 및 그를 포함하는 약학적 조성물에 관한 것으로서, 구체적으로 비핵산계 화합물인 하기 화학식 1로 표시되는 5-피리미딘카르복스아미드 유도체는 HBV (Hepatitis B Virus) 증식 뿐만 아니라 HIV (Human Immunodeficiency Virus) 증식을 억제하는 효과를 나타내므로 B형 간염 및 후천성 면역 결핍증의 치료제 및 예방제로서 유용하게 사용될 수 있다.

[화학식1]



상기 식에서, R₁ 및 R₂는 명세서에 기재된 바와 같다.

명세서


발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야 종래기술

본 발명은 신규의 5-피리미딘카르복사아미드 유도체에 관한 것으로, 보다 상세하게는 HBV 및 HIV의 증식 억제 효과가 뛰어나며, 하기 화학식 1로 표시되는 신규의 5-피리미딘카르복사아미드 유도체 및 그의 약학적으로 허용되는 염, 그의 제조방법과 상기 화합물을 유효 성분으로 하는 항바이러스용 약학적 조성물에 관한 것이다.

화학식 1



상기 화학식 1에서, R₁은 H, C₁~C₄인 직쇄 또는 분쇄상 알킬기, C₃~C₆인 사이클로알킬기 또는 C₂~C₃인 하이드록시알킬기이고, R₂는 인다졸-5-일 또는 인다졸-6-일이다.

B형 간염 바이러스 (Hepatitis B virus, HBV; 이하 "HBV"라 함)는 만성 또는 급성 간염을 일으키고 악화될 경우 간경화와 간암의 원인이 되는 병원체로서, 전세계적으로 3억의 인구가 HBV에 감염된 것으로 추산되고 있다 (Tiollais & Buendia, Sci. Am., 264, 48, 1991). 따라서 B형 간염의 치료 및 예방을 목적으로, HBV의 분자생물학적 특징을 비롯하여 HBV와 간질환과의 관련성에 대해 많은 연구가 진행되어 왔으며 B형 간염에 대한 백신 및 진단 시약도 다양하게 개발되었다. 또한 B형 간염의 치료제를 개발하기 위한 노력이 지속적으로 진행 중이다.

HBV의 게놈은 중합효소 유전자 (P; polymerase), 표면 항원 유전자 (S; surface protein; pre-S1, pre-S2, S), 중심 항원 유전자 (C; core protein; pre-C, C), X 단백질 유전자 등의 4가지 유전자로 구성된다. 이 중 중합효소, 표면 항원, 중심 항원 유전자는 구조 단백질을 발현하고, X 단백질 유전자는 조절 단백질을 발현하는 것으로 알려져 있다.

HBV 중합효소 유전자는 전체 바이러스 게놈의 80를 차지하고 845개의 아미노산으로 구성된 94kD 크기의 단백질을 생산하는데, 이 중합효소 단백질에는 바이러스 게놈의 복제에 필요한 일련의 기능들이 포함된다. 즉, 효소 활성으로 i) 단백질 시발체 (protein primer), ii) RNA 의존 DNA 중합효소 (RNA dependent DNA polymerase, RT), iii) DNA 의존 DNA 중합효소 (DNA dependent DNA polymerase, DDDP), iv) RNA 분해효소 (RNase H) 기능 등이 하나의 폴리펩타이드에 존재한다. 이 중 중합효소 단백질의 역전사 활성에 대해서는 카프란 (Kaplan) 등이 처음으로 밝혔으며, 이를 통해 HBV의 복제 기작에 대한 많은 연구가 이루어졌다.

HBV는 비리온 (virion) 외부의 표면 항원 단백질이 간세포-특이 수용체 (specific receptor)에 인식되어 간세포 내로 들어가는데, 이 때 HBV 중합효소 활성에 의해 불완전한 이중나선 DNA의 나머지 부분이 합성되어 HBV DNA 게놈이 완성된다. 완성된 HBV DNA 게놈은 세포 내 RNA 중합효소 활성에 의하여 전게놈 (pre-genomic) mRNA와 중심 항원 (C), 표면 항원 (S), 조절 단백질 (X) 등의 mRNA를 생산한다. 이들 mRNA로부터 바이러스 단백질이 만들어지며, 특히 중합효소 단백질은 바이러스 게놈을 합성하는 역할을 하며 중심 항원 단백질 및 전게놈 mRNA 등과 레플리카좀 (replicosome)이라는 구조물을 형성한다. 이를 캡시드화 (encapsidation)라고 하는데, 중합효소 단백질은 3'-말단에 글루탐산이 반복되는 부위의 핵산 친화력으로 캡시드화가 용이하다. 레플리카좀이 형성되면 HBV 중합효소 단백질의 역전사 활성에 의해 (-) DNA 사슬이 합성되고, DNA 의존 DNA 중합효소 활성에 의해 (+) DNA 사슬이 합성되고 이는 다시 전게놈 mRNA들을 생산하며, 이러한 과정이 반복됨으로써 세포 내에 200~300개 이상의 게놈 DNA 풀 (pool)이 유지된다 (Tiollais and Buendia, Scientific American, 264: 48-54, 1991).

한편 HBV와 HIV는 서로 다른 종류의 바이러스지만 이들의 증식 과정에는 공통된 복제 과정이 있다. 즉, 바이러스 RNA로부터 DNA로 전사가 일어나는 역전사 과정과 역전사로 생성된 RNA-DNA 하이브리드의 RNA 부분을 분해 소거하는 과정이 공통적이다.

최근 후천성 면역 결핍증 (Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS; 이하 "에이즈"라 함) 또는 대상포진 감염증

의 치료제로 개발되어 오던 라미부딘 (lamivudine), 팜비어 (famvir) 등의 핵산계 (nucleosides) 화합물의 HBV 억제제로서의 유용성에 대해 보고된 바 있다 (Gerin J. L, Hepatology, 14: 198-199, 1991; Lok A. S. P., J. Viral Hepatitis, 1: 105-124, 1994; Dienstag, J. L. et al., New England Journal of Medicine, 333: 1657-1661, 1995). 그러나 이러한 핵산계 화합물들은 값이 매우 비싸서 환자의 경제적인 부담이 크고, 더욱이 핵산계 화합물들은 본질적으로 부작용, 즉 독성, 내성 바이러스의 출현 및 약물 투여 중단 후 재발 등에 있어 심각한 문제점을 내포하고 있기 때문에 B형 간염 치료제로서는 부적합한 것으로 알려져 있다. 따라서 비핵산계 (non-nucleosides) 화합물 중에서 B형 간염 치료제를 개발하려는 노력이 이어졌으며, HBV에 대해 항바이러스 활성을 갖는 퀴놀론계 화합물 (유럽 특허공개 제563732호, 제563734호), 이리도이드계 화합물 (대한민국 특허공개 제94-1886호), 테레프탈산아미드 유도체 (대한민국 특허출원 제 96-72384호, 제 97-36589호, 제99-5100호) 등이 보고되었다. 그러나 많은 노력에도 불구하고 아직까지는 B형 간염에 대한 뚜렷한 치료제는 개발되어 있지 않으며, B형 간염의 치료는 주로 대증요법 (對症療法)에 의존하고 있는 실정이다.

한편 에이즈는 체내의 세포 면역 기능이 뚜렷하게 떨어져 보통 사람에게서는 볼 수 없는 희귀한 각종 감염증이 발생하고 이것이 전신에 퍼지는 질환으로서, 에이즈 바이러스인 HIV (Human Immunodeficiency Virus, 이하 "HIV"라 함)의 주된 공격목표는 면역 기능을 조절하는 T 세포 중 하나인 보조 T 세포 (helper T cell)인 것으로 알려져 있다. 보조 T 세포가 HIV에 감염되어 과사를 일으키면 인체의 면역 기능이 제대로 작용하지 못하여 면역 결핍 상태를 일으키며, 이로 인해 치명적인 감염과 악성 종양 등을 일으키게 된다. 에이즈 환자는 1981년 미국에서 처음으로 발견된 이래, 1993년 187개국에서 85만 명이 넘는 것으로 보고되었다 (세계보건기구 (WHO)의 1993년 말 보고서). 더욱이 세계보건기구의 보고에 의하면, 2000년까지 3천만~4천만 명이 더 감염되어 그 중 1천만~2천만 명이 발병할 것으로 예측하였다.

현재 에이즈 치료에는 HIV의 증식 과정을 억제하는 약물이 가장 널리 사용되고 있는데, 1987년 가장 먼저 개발된 지도부딘 (Zidovudine (ZDV), 이전에는 Azidothymidine (AZT)로 명명되었음), 지도부딘에 의한 부작용이 있거나 치료 효과가 나타나지 않을 때 대체약으로서 1991년 개발된 디다노신 (Didanosine (ddI)) 및 1992년 지도부딘과 병용 사용이 허가된 잘시타빈 (Zalcitabine (ddC)) 등이 있다. 이들 약물은 에이즈 환자의 증세를 완화시키고 HIV 감염자의 에이즈로의 이행을 늦추거나 생존 기간을 다소 연장시키는 효과를 나타낸다. 그러나 완치 능력은 없으며 내성 및 부작용이 문제가 되고 있다.

이에 본 발명자들은 부작용 및 독성이 적고, 내성 바이러스 출현이 낮은 새로운 B형 간염의 치료제 개발을 목적으로 HBV에 대해 우수한 항바이러스 활성을 나타내는 비핵산계 화합물을 개발하기 위해 노력한 결과, 상기 화학식 1로 표시되는 신규의 5-피리미딘카르복스아미드 유도체를 합성하였으며 이 물질이 HBV 증식 억제 효과 뿐만 아니라 HIV 증식 억제 효과가 우수함을 밝힘으로써 본 발명을 완성하였다.

발명이 이루고자하는 기술적 과제


본 발명의 목적은 HBV 및 HIV의 증식 억제 효과가 뛰어난 새로운 5-피리미딘카르복스아미드 유도체와 약학적으로 허용되는 그의 염 및 그의 제조방법을 제공하는 것이다.

또한 본 발명의 목적은 상기 화합물을 유효 성분으로 하며 부작용이 적고 경제적인, B형 간염 또는 에이즈 치료 및 예방 위한 약학적 조성물을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에서는 하기 화학식 1로 표시되는 새로운 5-피리미딘카르복스아미드 유도체 및 약학적으로 허용되는 그의 염을 제공한다.


화학식 1




상기 화학식 1에서, R₁은 H, C₁~C₄인 직쇄 또는 분쇄상 알킬기, C₃~C₆인 사이클로알킬기 또는 C₂~C₃인 하이드록시알킬기이고, R₂는 인다졸-5-일 또는 인다졸-6-일이다.

본 발명에서 인다졸-5-일 및 인다졸-6-일은 각각 하기 화학식 2와 화학식 3으로 표시된다.

[화학식2]



[화학식3]



바람직하기로는 상기 화학식 1에서 R_1 이 H, 메틸, 에틸, 이소프로필, 사이클로프로필 또는 2-하이드록시에틸기이고, R_2 가 인다졸-5-일 또는 인다졸-6-일이다.

본 발명의 화학식 1의 화합물은 약학적으로 허용 가능한 염의 형태로 사용할 수 있으며, 염으로는 약학적으로 허용 가능한 유리산 (free acid)에 의해 형성된 산부가염이 유용하다. 화학식 1의 화합물은 당해 기술 분야에서 통상적인 방법에 따라 약제학적으로 허용되는 산 부가염을 형성할 수 있다. 유리산으로는 유기산과 무기산을 사용할 수 있으며, 무기산으로는 염산, 브롬산, 황산, 인산 등을 사용할 수 있고 유기산으로는 구연산 (citric acid), 초산, 젖산, 주석산 (tartaric acid), 말레인산, 푸마르산 (fumaric acid), 포름산, 프로피온산 (propionic acid), 옥살산, 트리플루오로아세트산, 벤조산, 글루콘산, 메탄술폰산, 글리콜산, 숙신산, 4-톨루엔술폰산, 갈락투론산, 엠본산, 글루탐산 또는 아스파르트산 등을 사용할 수 있다.

또한 본 발명에서는 하기 반응식 1로 표시되는 화학식 1의 5-피리미딘카르복스아미드 유도체의 제조방법을 제공한다.

상기 반응식 1에서, R_1 및 R_2 는 화학식 1에서 정의한 바와 같다.

본 발명의 제조방법은 1) 4-클로로-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 (2)와 5-아미노인다졸 또는 6-아미노인다졸 (3)을 염기 존재 하에 적당한 온도 및 적당한 용매 중에서 반응시켜 5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 유도체 (4)를 제조하는 단계 (단계 1); 및 2) 상기 단계 1에서 제조된 5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 유도체 (4)와 적절한 아민 화합물 (5)을 적당한 온도 및 적당한 용매 중에서 반응시켜 화학식 1의 5-피리미딘카르복스아미드 유도체를 제조하는 단계 (단계 2)로 이루어진다.

상기 단계 1 및 단계 2에서 출발 물질 및 반응 물질로 사용되는 4-클로로-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 (2), 5-아미노인다졸 또는 6-아미노인다졸 (3) 및 아민 화합물 (5)은 상업적으로 시판되는 물질로서 쉽게 구할 수 있다. 특히, 아민 화합물 (5)은 값이 저렴하다.

또한 상기 단계 2의 아민 화합물 (5)은 화학식 1의 화합물에 치환기 R_1 을 도입하기 위한 물질로서, 치환기의 종류에 따라 적절한 아민 화합물 (5)을 선택할 수 있다. 이러한 아민 화합물 (5)로는 예를 들어, 암모니아 메탄올 용액, 메틸아민 메탄올 용액, 에틸아민 수용액, 이소프로필아민, 사이클로프로필아민, 에탄올아민, 프로판올아민 등이 있으며, 모두 상업적으로 구입할 수 있는 물질이다.

상기 단계 1을 좀 더 구체적으로 설명하면, 염기로는 유기 염기를 사용할 수 있으며, 예를 들어 트리에틸아민, N,N-디이소프로필에틸아민, N-메틸모르폴린, N-메틸피페리딘, 4-디메틸아미노피리딘, N,N-디메틸아닐린, 2,6-루티딘, 피리딘 등과 같은 일반적인 삼급 유기 염기를 사용하는 것이 바람직하다.

반응 온도는 20~40℃인 것이 바람직하고, 반응 시간은 1~6시간으로 하는 것이 바람직하다.

반응 용매로는 메탄올, 에탄올 등의 알코올류, 클로로포름, 메틸렌 클로라이드, 아세토니트릴 등에서 선택되는 단일 용매 또는 혼합 용매를 사용하는 것이 바람직하다.

또한 상기 단계 2를 좀 더 구체적으로 설명하면, 반응 용매로는 물, 메탄올, 에탄올, 이소프로판올 등의 알코올류, 아세토니트릴, 클로로포름, 메틸렌 클로라이드 등에서 선택되는 단일 용매 또는 혼합 용매를 사용하는 것이 바람직하다.

반응 온도는 아민 화합물 (5)의 종류에 따라 달라질 수 있으며, 25~60℃인 것이 바람직하다.

아민 화합물 (5)은 5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 유도체 (4)에 대하여 과량 사용하는 것이 바람직하다.

또한 본 발명에서는 화학식 1의 5-피리미딘카르복스아미드 유도체 및/또는 약학적으로 허용되는 그의 염을 유효 성분으로 포함하는 B형 간염의 치료제 또는 예방제용 약학적 조성물을 제공한다.

또한 본 발명에서는 화학식 1의 5-피리미딘카르복스아미드 유도체 및/또는 약학적으로 허용되는 그의 염을 유효 성분으로 포함하는 후천성 면역 결핍증의 치료제 또는 예방제용 약학적 조성물을 제공한다.

본 발명의 화학식 1로 표시되는 5-피리미딘카르복스아미드 유도체는 HBV와 HIV의 증식 과정에 공통적으로 존재하는 복제 과정, 즉 바이러스 RNA로부터 DNA로 역전사가 일어나고 생성된 RAN-DNA 하이브리드에서 RNA 부분이 분해되는 과정을 저해하는 작용 기전을 갖고 있어, HBV 뿐만 아니라 HIV에 대해서도 증식 억제 활성을 갖는다.

화학식 1의 화합물은 임상 투여시에 경구 또는 비경구로 투여, 예를 들어 정맥 내, 피하, 복강 내 또는 국소 적용할 수 있으며, 일반적인 의약품 제제의 형태로 사용될 수 있다.

본 발명의 약학적 조성물을 임상적으로 이용시에는 약제학적 분야에서 통상적인 담체와 함께 배합하여 약제학적 분야에서 통상적인 제제, 예를 들면 정제, 캡슐제, 트로키제, 액제, 현탁제 등의 경구 투여용 제제; 주사용 용액 또는 현탁액, 또는 주사시에 주사용 증류수로 제조하여 사용할 수 있는 즉시 사용형 주사용 건조분말 등의 형태인 주사용 제제 등의 다양한 제제로 제형화할 수 있다.

화학식 1의 화합물의 유효 용량은 일반적으로 성인에게 10~500 mg/kg이고, 바람직하기로는 50~300 mg/kg이며, 의사 또는 약사의 판단에 따라 일정 시간 간격으로 1일 수회, 바람직하기로는 하루 1~6회 분할 투여될 수 있다.

이하 본 발명을 실시예에 의하여 더욱 상세하게 설명한다.

단, 하기 실시예들은 본 발명을 예시하는 것으로 본 발명의 내용이 실시예에 의해 한정되는 것은 아니다.

〈제조예 1〉 4-(1H-5-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르의 제조메탄올 70 mL에 4-클로로-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 5 g, 5-아미노인다졸 3.15 g 및 트리에틸아민 3.5 mL를 차례로 가한 후, 30℃에서 3시간 동안 반응시켰다. 반응 혼합물을 냉각하여 20℃에서 1시간 동안 교반시킨 후 여과하여 메탄올 20 mL로 세척하였다. 얻어진 결정을 40~50℃에서 진공 건조하여 6.15 g (수율 87)의 목적 화합물을 얻었다.

m.p. : 199~201 °C

¹H-NMR (DMSO-d₆), ppm : δ1.34(t, 3H), 2.42(s, 3H), 4.34(m, 2H), 7.48(d, 1H), 7.53(d, 1H), 8.06(d, 2H), 8.70(s, 1H), 10.18(s, 1H), 13.10(br s, 1H)

〈제조예 2〉 4-(1H-6-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르의 제조메탄올 70 mL에 4-클로로-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 5 g, 6-아미노인다졸 3.15 g 및 N,N-디이소프로필에틸아민 4.2 mL를 차례로 가한 후, 30~35℃에서 4시간 동안 반응시켰다. 반응 혼합물을 냉각하여 20℃에서 1시간 동안 교반시킨 후 여과하고 메탄올 20 mL로 세척하였다. 얻어진 결정을 40~50℃에서 진공 건조하여 5.8 g (수율 82)의 목적 화합물을 얻었다.

m.p. : 212~214 °C

¹H-NMR (DMSO-d₆), ppm : δ1.33(t, 3H), 2.53(s, 3H), 4.33(m, 2H), 7.10(d, 1H), 7.70(d, 1H), 8.00(s, 1H), 8.22(s, 1H), 8.72(s, 1H), 10.40(s, 1H), 13.09(br s, 1H)

〈실시예 1〉 4-(1H-5-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복스아미드의 제조클로로포름 10 mL에 제조예 1에서 제조된 4-(1H-5-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 1 g을 가하고 암모니아

10메탄올 용액 20 mL를 가한 후, 서서히 가열하여 40℃에서 2일간 반응시켰다. 반응 혼합물을 감압 농축한 후 메탄올 15 mL를 가하여 결정화시켰다. 용액을 20℃에서 동안 교반시킨 후 여과하고, 결정을 다시 클로로포름 : 에탄올 = 1 : 1 (부피비)의 혼합 용매로 재결정하여 0.62 g (수율 68)의 목적 화합물을 얻었다.

m.p. : > 270 °C

¹H-NMR (DMSO-d₆), ppm : δ2.49(s, 3H), 7.47(d, 1H), 7.55(d, 1H), 7.73 (br s, 1H), 8.07(s, 1H), 8.15(s, 1H), 8.28(br s, 1H), 8.71(s, 1H), 11.46(s, 1H), 13.07(br s, 1H)

<실시에 2> 4-(1H-6-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복스아미드의 제조제조에 2에서 제조된 4-(1H-6-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르를 사용한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법에 의해 목적 화합물 (수율 62)을 얻었다.

¹H-NMR (DMSO-d₆), ppm : δ2.56(s, 3H), 7.06(d, 1H), 7.70(d, 1H), 7.81(br s, 1H), 7.98(s, 1H), 8.28(s, 1H), 8.32(br s, 1H), 8.73(s, 1H), 11.75(s, 1H), 13.02(br s, 1H)

<실시에 3> 4-(1H-5-인다졸릴아미노)-N-메틸-2-메틸티오-5-피리미딘카르복스아미드의 제조메탄올 40메탄올 용액 30 mL에 상기 제조에 1에서 제조된 4-(1H-5-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 1.5 g을 가하고 25~30 °C에서 1시간 동안 반응시켰다. 반응 혼합물을 20~25 °C로 식히고 여기에 물 90 mL를 가하여 30분 동안 교반시킨 후 여과하고 25메탄올 10 mL로 세척하여 1.26 g (수율 88)의 목적 화합물을 얻었다.

m.p. : 259~261 °C

¹H-NMR (DMSO-d₆), ppm : δ2.46(s, 3H), 2.80(d, 3H), 7.45(d, 1H), 7.52(d, 1H), 8.03(s, 1H), 8.13(s, 1H), 8.61(s, 1H), 8.75(br s, 1H), 11.28(s, 1H), 13.06(br s, 1H)

<실시에 4> 4-(1H-6-인다졸릴아미노)-N-메틸-2-메틸티오-5-피리미딘카르복스아미드의 제조제조에 2에서 제조된 4-(1H-6-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르를 사용한 것을 제외하고는, 상기 실시예 3과 동일한 방법에 의해 목적 화합물 (수율 92)을 얻었다.

m.p. : 263~265 °C

¹H-NMR (DMSO-d₆), ppm : δ2.56(s, 3H), 2.81(d, 3H), 7.05(d, 1H), 7.69(d, 1H), 7.98(s, 1H), 8.28(s, 1H), 8.67(s, 1H), 8.79(br s, 1H), 11.57(s, 1H), 13.02(br s, 1H)

<실시에 5> N-에틸-4-(1H-5-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복스아미드의 제조메탄올 20 mL에 상기 제조에 1에서 제조된 4-(1H-5-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 1 g을 가하고 실온에서 에틸아민 70수용액 25mL를 서서히 가한 후, 30~35℃에서 3시간 동안 반응시켰다. 반응 혼합물을 냉각시켜 20℃에서 물 30 mL를 서서히 가한 후 30분 동안 교반시켜 여과하고 30메탄올 10 mL로 세척하여 0.8 g (수율 80)의 목적 화합물을 얻었다.

m.p. : 252~254 °C

¹H-NMR (DMSO-d₆), ppm : δ1.17(t, 3H), 2.49(s, 3H), 3.33(m, 2H), 7.48(d, 1H), 7.55(d, 1H), 8.07(s, 1H), 8.15(s, 1H), 8.65(s, 1H), 8.78(br s, 1H), 11.29(s, 1H), 13.09(br s, 1H)

<실시에 6> N-사이클로프로필-4-(1H-6-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복스아미드의 제조메탄올 20 mL에 제조에 2에서 제조된 4-(1H-6-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 1 g을 가하고 실온에서 사이클로프로필아민 7 mL를 가한 후, 가열하여 50℃에서 6시간 동안 반응시켰다. 반응 혼합물을 냉각하여 25℃에서 물 20 mL를 서서히 가하여 30분 동안 교반시킨 후 여과하고 30메탄올 10 mL로 세척하고, 이 때 얻은 결정을 에탄올로 재결정하여 0.67 g (수율 65)의 목적 화합물을 얻었다.

m.p. : > 270 °C

¹H-NMR (DMSO-d₆), ppm : δ0.54(m, 2H), 0.67(m, 2H), 2.49(s, 3H), 2.78(m, 1H), 7.00(d, 1H), 7.63(d, 1H), 7.92(s, 1H), 8.21(s, 1H), 8.58(s, 1H), 8.69(br s, 1H), 11.46(s, 1H), 12.97(br s, 1H)

<실시에 7> N-(2-하이드록시에틸)-4-(1H-5-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복스아미드의 제조메탄올 20 mL에 상기 제조에 1에서 제조된 4-(1H-5-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에

테르 1 g을 가하고 에탄올아민 7 mL을 가한 후 가열하여 4시간 동안 환류시켰다. 반응 혼합물을 냉각하여 20℃에서 물 40 mL을 서서히 가하고 30분 동안 교반시킨 후 여과하고 25메탄올 10 mL로 세척하여 0.75 g (수율 72)의 목적 화합물을 얻었다.

m.p. : > 270 °C

¹H-NMR (DMSO-d₆), ppm : δ2.45(s, 3H), 3.36(m, 2H), 3.55(m, 2H), 4.81(m, 1H), 7.47(d, 1H), 7.54(d, 1H), 8.06(s, 1H), 8.15(s, 1H), 8.71(s, 1H), 8.77(br s, 1H), 11.25(s, 1H), 13.07(br s, 1H)

<실시예 8> N-(2-하이드록시에틸)-4-(1H-6-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카복사미드의 제조

제조예 2에서 제조된 4-(1H-6-인다졸릴아미노)-2-메틸티오-5-피리미딘카복실산 에틸 에스테르를 사용한 것을 제외하고는, 상기 실시예 7과 동일한 방법에 의해 목적 화합물 (수율 76)을 얻었다.

m.p. : 269~270 °C

¹H-NMR (DMSO-d₆), ppm : δ2.56(s, 3H), 3.33(m, 2H), 3.54(m, 2H), 4.79(m, 1H), 7.04(d, 1H), 7.69(d, 1H), 7.98(s, 1H), 8.27(s, 1H), 8.72(s, 1H), 8.81(br s, 1H), 11.52(s, 1H), 13.03(br s, 1H)

상기 실시예 1~8을 통해 제조된 화학식 1의 화합물을 하기 표 1에 나타내었다.

[표 1]

실시예	R1	R2
1	H	인다졸-5-일
2	H	인다졸-6-일
3	메틸	인다졸-5-일
4	메틸	인다졸-6-일
5	에틸	인다졸-5-일
6	사이클로프로필	인다졸-6-일
7	2-하이드록시에틸	인다졸-5-일
8	2-하이드록시에틸	인다졸-6-일

<실험예 1> HBV 중합효소에 대한 생체의 역전사 활성 저해 효과화합식 1의 화합물들이 HBV 중합효소의 역전사 활성을 저해하는 효과를 알아보기 위하여, 하기와 같은 생체의 (in vitro) 실험을 실시하였다.

본 발명자들은 대장균에서 발현시켜 분리한 HBV의 재조합 중합효소 단백질, 그의 제조방법 및 그의 효소 활성을 측정하는 방법에 대해 이미 특허 출원한 바 있으며 (대한민국 특허출원 제94-3918호 및 제96-33998호), 본 실험에서는 상기와 같이 대장균에 발현시킨 HBV 중합효소를 사용하였다.

본 발명에서 사용된 생체외에서 B형 간염 바이러스 중합효소의 역전사효소 활성 측정 방법은 다음과 같다. 기본적인 원리는 효소면역학적 방법 (ELISA)과 동일하며, 바이오틴-(biotin-), DIG- (digoxigenin-)으로 수식된 뉴클레오티드를 기질에 포함시켜 반응시킨 다음, 중합된 기질을 과산화효소가 붙어 있는 항-DIG 항체로 인식하는 방법을 이용하였다.

HBV 중합효소 20μL를 스트렙타비딘 (streptavidin)으로 코팅된 웰에 넣고 반응 혼합물 [각각 10 μM의 DIG-UTP, Biotin-UTP, 46 mM Tris-HCl, 266 mM KCl, 27.5 mM MgCl₂, 9.2 mM DTT 기질/프라이머 하이브리드] 20μL, 시험 물질 20 μL (농도가 각각 1, 0.1, 0.01 μg/mL이 되도록 첨가)를 섞어 22℃에서 15시간 반응시켰다. 이 때 HBV 중합효소의 작용에 의해 DNA가 만들어지고 디곡옥시게닌 (digoxigenin) 및 바이오틴이 붙은 뉴클레오티드가 포함되었기 때문에 이 DNA는 웰 바닥에 코팅되어 있던 스트렙타비딘과 결합하게 된다. 반응이 끝나면 남아 있는 불순물 등을 제거하기 위해 각 웰 당 250 μL의 세척 완충액 (pH 7.0)으로 30초씩 5번 씻어 주었다. 각 웰에 항-DIG-POD 항체 (anti-DIG-POD antibody)를 200 μL씩 가하여 37℃에서 1시간 동안 반응시킨 후, 불순물을 제거하기 위해 세척 완충액으로 각 웰을 씻어 주었다. 그 후 POD (peroxidase)의 기질인 ABTS™를 각각 200μL씩 가하여 30분간 상온에서 반응시키고 ELISA 판독기를 이용하여 405 nm에서의 흡광도를 측정하였다.

HBV 중합효소의 역전사 활성에 대한 저해율은 시험 화합물을 넣지 않은 대조군을 기준으로 계산하였으며, 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.

[표2]

HBV 중합효소의 역전사 활성에 대한 저해 효과

시험 화합물	HBV-RT의 활성 저해율 (%)		
	1 $\mu\text{g}/\text{ml}$	0.1 $\mu\text{g}/\text{ml}$	0.01 $\mu\text{g}/\text{ml}$
실시에 1	90	63	40
실시에 2	85	55	36
실시에 3	88	59	34
실시에 4	96	77	52
실시에 5	70	52	20
실시에 6	74	43	24
실시에 7	93	76	48
실시에 8	95	68	50

상기 표 2에서 볼 수 있듯이, 본 발명의 화합물들은 1 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 의 농도에서 HBV 중합효소에 대한 활성 저해율이 70이상, 최고 96에 이르는 등 HBV 중합효소의 활성을 억제하는 효과가 매우 우수하다. 또한 본 발명의 화합물들은 비핵산계 물질이므로 핵산계 물질들이 갖고 있는 독성 및 내성 바이러스의 조기 출현 등의 문제점을 해결할 수 있을 것으로 기대되며, 핵산계 물질들과 작용 기전이 상이하므로 핵산계 물질들과 병용요법제로도 사용할 수 있다.

이와 같이 본 발명의 화합물들은 HBV의 복제에 중요한 역할을 하는 HBV 중합효소의 활성을 저해하는 효과가 우수하므로 이를 기전으로 HBV의 증식을 억제할 수 있으며, 따라서 B형 간염의 예방제 및 치료제로서 유용하게 사용될 수 있다.

<실험예 2> HBV 생산 세포주를 이용한 HBV 증식 저해 활성 효과화학적 1의 화합물들이 HBV 생산 세포주의 증식을 저해하는 효과를 알아보기 위하여, 하기와 같은 실험을 실시하였다.

항바이러스 활성을 검색하기 위해 인간 간암 세포주인 HepG 2.2.15를 이용하여 HBV가 복제, 증식되는 정도를 측정하였다.

세포 농도를 1×10^5 세포수/ml로 조정 한 다음 24-웰 세포 배양판에 1 ml/웰 씩 분주하였다. 이것을 37℃의 5CO

₂ 배양기에서 배양하였는데, 매일 배지를 갈아주며 세포가 충분히 자랄 때 (confluent)까지 3~4일간 배양하였다. 세포가 충분히 자란 뒤, 최종 농도가 각각 0.01, 0.1, 1 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 이 되도록 시험 화합물을 가해 주었다. 시험 화합물을 가하고 1주일 후 배양액을 취하여 5,000 rpm에서 10분간 원심분리하였다. 상등액 25 μl 를 새 튜브에 옮기고, 각각 5 μl 의 용해 (lysis) 용액 [0.54N NaOH, 0.06NP40]을 첨가하여 37℃에서 1시간 동안 배양하였다. 배양 후 중화 용액 [0.09N HCl, 0.1M Tris-HCl, pH 7.4] 30 μl 를 첨가하여 경쟁적 PCR (Competitive Polymerase Chain Reaction)을 위한 반응액으로 사용하였다.

PCR은 HBV의 중심 항원 (core) 유전자 서열을 주형으로 하여 수행하였다. 25 pmol의 각 시발체, 250 μM dNTP, 5 μl 의 상기 PCR 반응액 [0.54N NaOH, 0.06NP40, 0.09N HCl, 0.1M Tris-HCl, pH 7.4]에 1 유닛 (unit)의 Taq 중합효소를 가하여 PCR 반응시켰다.

PCR로 증폭된 DNA는 아가로스 겔로 전기영동한 후, 영상 분석기 (Gel Doc 1000, BIO-RAD)를 이용하여 HBV의 DNA를 정량 분석함으로써 본 발명의 화합물들의 HBV 증식 저해 활성을 평가하였다.

양성 대조군으로는 3TC (lamivudine, 글락소 웰컴)를 사용하였으며, 시험 화합물과 같은 농도로 처리하였다. HBV 증식 저해 활성율은 시험 화합물을 넣지 않은 대조군을 기준으로 계산하였으며, 그 결과를 하기 표 3에 나타내었다.

[표3]

HBV 증식 저해 활성 효과

시험 화합물	HBV 증식 저해 활성율 (%)		
	1 $\mu\text{g}/\text{ml}$	0.1 $\mu\text{g}/\text{ml}$	0.01 $\mu\text{g}/\text{ml}$
실시에 1	82	53	25

실시에 2	70	40	20
실시에 3	75	42	15
실시에 4	94	70	32
실시에 7	92	61	21
실시에 8	88	72	40
3TC	99	80	48

상기 표 3에서 볼 수 있듯이, 본 발명의 화합물들은 비핵산계 물질로서 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 의 농도에서 HBV에 대한 증식 저해 활성율이 70이상, 최고 94에 이르는 등 HBV 중합효소의 역전사 활성을 억제하는 효과가 매우 우수하다. 특히, 본 발명의 화합물들은 비핵산계 물질이므로 핵산계 물질 등이 갖고 있는 독성 및 내성 바이러스의 조기 출현 등의 문제점을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 핵산계 물질들은 중합효소의 활성 도메인에 작용하는 반면 본 발명의 화합물들은 알로스테릭 바인딩 포켓 (allosteric binding pocket)에 작용할 것으로 예상되므로, 본 발명의 화합물들은 핵산계 물질들과의 병용요법제로도 사용할 수 있다.

이와 같이 본 발명의 화합물들은 HBV의 복제 단계 중 역전사 단계에 중요한 역할을 하는 HBV 중합효소의 역전사 활성을 저해하는 효과가 우수하므로 이를 기전으로 HBV의 증식을 억제할 수 있으며, 따라서 B형 간염의 예방제 및 치료제로서 유용하게 사용될 수 있다.

<실험예 3> HIV 역전사 효소에 대한 생체외 활성 저해 효과화학적 1의 화합물들이 HIV 역전사 효소의 활성을 저해하는 효과를 알아보기 위하여, 하기와 같은 생체외 실험을 실시하였다.

비방사성 역전사 효소 분석 키트 (Non-radioactive reverse transcriptase assay Kit, Boehringer Mannheim)를 사용하여 생체외 저해 활성을 측정하였다.

스트렙타비딘 (streptavidin)으로 코팅된 웰에 HIV 역전사 효소 20 μL (40 ng)을 넣고, 주형-시발체 하이브리드 poly(A)·올리고(dT)₁₅와 DIG-(디고옥시게닌)-dUTP, 바이오틴-dUTP, TTP가 포함된 반응 혼합액 (reaction mixture) 20 μL 를 가한 후, 여기에 최종 농도 0.1, 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 가 되도록 시험 화합물을 가하여 1시간 동안 37°C에서 반응시켰다. 이 때, HIV 역전사 효소의 작용에 의하여 RNA로부터 DNA가 만들어지며, 디고옥시게닌 (digoxigenin)과 바이오틴 (biotin)이 표지된 뉴클레오티드가 함께 포함되어 있으므로 DNA가 웰의 바닥에 코팅되어 있는 스트렙타비딘과 결합하게 된다.

반응 종료 후, 남아 있는 불순물을 제거하기 위해 각 웰 당 250 μL 의 세척용 완충 용액 (pH 7.0)으로 30초간 5회 세척하였다. 세척 후 항-DIG-POD 항체를 200 μL 씩 가하여 37°C에서 1시간 동안 반응시키고, 불순물 제거를 위해 다시 상기와 같은 세척용 완충 용액으로 세척하였다. 세척 후 각 웰에 POD (peroxidase)의 기질 (substrate)인 ABTS™를 각각 200 μL 씩 가하여 30분간 상온에서 반응시켰다. 반응 종료 후, ELISA 판독기를 이용하여 각 용액의 405 nm에서의 흡광도를 측정함으로써 HIV의 역전사 효소 활성이 저해된 정도를 정량하였다. HIV 역전사 효소 활성에 대한 저해율은 시험 화합물을 넣지 않은 대조군을 기준으로 계산하였으며, 그 결과를 하기 표 4에 나타내었다.

[표 4]

HIV 역전사 효소 활성에 대한 저해 효과

화합물	HIV-RT 활성 저해율 (%)	
	1 $\mu\text{g}/\text{mL}$	0.1 $\mu\text{g}/\text{mL}$
실시에 1	65	44
실시에 3	62	48
실시에 4	70	42
실시에 5	80	57
실시에 6	78	54

상기 표 4에서 볼 수 있듯이, 본 발명의 화합물들은 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 의 농도에서 HIV-RT (HIV 역전사 효소)에 대한 활성 저해율이 60이상, 최고 80에 이르는 등 HIV 역전사 효소의 활성을 억제하는 효과가 매우 우수하다. 특히, 본 발명의 화합물들은 비핵산계 물질이므로 핵산계 물질 등이 갖고 있는 독성 및 내성 바이러스의 조기 출현 등의 문제점을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 핵산계 물질들은 중합효소의 활성 도메인에 작용하는 반면 본 발명의 화합물들은 알로스테릭 바인딩 포켓 (allosteric binding pocket)에 작용할 것으로 예상되므로, 본 발명의 화합물들은 핵산계 물질들과의 병용요법제로도 사용할 수 있다.

이와 같이 본 발명의 화합물들은 HIV의 복제 단계 중 역전사 단계에 중요한 역할을 하는 HIV 역전사 효소의 활성을 저해하는 효과가 우수하므로 이를 기전으로 HIV의 증식을 억제할 수 있으며, 따라서 후천성 면역 결핍증의 예방제 및 치

료제로서 유용하게 사용될 수 있다.

〈실험예 4〉 세포 독성 시험화학적 1의 화합물들이 세포 독성 (cytotoxicity)을 나타내는지 알아보기 위하여, HepG2 세포를 이용하여 일반적으로 널리 알려진 MTT 분석 방법으로 시험관 내 (in vitro) 실험을 실시하였다.

그 결과, 실험에 사용된 화합물은 모두 CC_{50} 이 $100 \mu\text{g/ml}$ 이상으로서, 세포에 대한 독성이 매우 적은 물질인 것으로 판명되었다.

〈실험예 5〉 랫트에 대한 경구 투여 급성 독성 실험화학적 1의 화합물의 급성 독성을 알아보기 위하여 하기와 같은 실험을 수행하였다.

6주령의 특정병원부재 (SPF) SD계 랫트를 사용하여 급성 독성 실험을 실시하였다. 군당 6 마리씩의 동물에 실시예 1~8의 화합물을 각각 0.5메틸셀룰로스 용액에 현탁하여 4 g/kg/15ml 의 용량으로 1회 경구 투여하였다. 시험 물질 투여 후 동물의 폐사 여부, 임상 증상 및 체중 변화 등을 관찰하고 혈액학적 검사와 혈액 생화학적 검사를 실시하였으며 부검하여 육안으로 복강 장기와 흉강 장기의 이상 여부를 관찰하였다. 시험 결과, 시험 물질을 투여한 모든 동물에서 특기할 만한 임상 증상은 없었고 폐사된 동물도 없었으며, 또한 체중 변화, 혈액검사, 혈액 생화학 검사, 부검 소견 등에서도 독성 변화는 관찰되지 않았다. 이상의 결과 실험된 화합물은 모두 랫트에서 4 g/kg 까지 독성 변화를 나타내지 않으며, 경구 투여 최소 치사량 (LD

50)은 4 g/kg 이상인 안전한 물질로 판단되었다.

발명의 효과


상기에서 살펴 본 바와 같이, 본 발명에 의한 상기 화학식 1로 표시되는 신규의 5-피리미딘카르복사아미드 유도체는 HBV 및 HIV의 증식을 억제하는 효과가 뛰어나고 부작용도 적으므로 B형 간염 및 후천성 면역 결핍증의 예방제 및 치료제로서 유용하게 사용될 수 있다. 특히, 본 발명의 화합물들은 비핵산계 물질이기 때문에 핵산계 물질들이 갖고 있는 독성 및 내성 바이러스의 조기 출현 등의 문제점을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 핵산계 화합물들은 중합효소의 활성 도메인에 작용하는 반면 본 발명의 화합물들은 알로스테릭 바인딩 포켓에 작용할 것으로 예상되므로, 본 발명의 화합물들은 핵산계 화합물들과의 병용요법제로도 사용될 수 있는 장점이 있다.

(57)청구의 범위

청구항1

하기 화학식 1로 표시되는 5-피리미딘카르복사아미드 유도체 및 약학적으로 허용 가능한 그의 염.

화학적식 1



상기 화학식 1에서, R_1 은 H, $C_1 \sim C_4$ 인 직쇄 또는 분쇄상 알킬기, $C_3 \sim C_6$ 인 사이클로알킬기 또는 $C_2 \sim C_3$ 인 하이드록시알킬기이고, R_2 는 인다졸-5-일 또는 인다졸-6-일이다.


청구항2

제 1 항에 있어서, R_1 은 H, 메틸, 에틸, 사이클로프로필 또는 2-하이드록시에틸기이고, R_2 는 인다졸-5-일 또는 인다졸-6-일인 것을 특징으로 하는 5-피리미딘카르복사아미드 유도체 및 약학적으로 허용 가능한 그의 염.

청구항3

1) 4-클로로-2-메틸티오-5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 (2)와 5-아미노인다졸 또는 6-아미노인다졸 (3)을 염기 존재 하에 용매 중에서 반응시켜 5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 유도체 (4)를 제조하는 단계 (단계 1); 및 2) 상기 단계 1에서 제조된 5-피리미딘카르복실산 에틸 에스테르 유도체 (4)와 적절한 아민 화합물 (5)을 용매 중에서 반응시켜 화학식 1의 5-피리미딘카르복사아미드 유도체를 제조하는 단계 (단계 2)로 이루어지는 제 1 항의 5-피리미딘카르복사아미드 유도체의 제조방법.

반응식 1



상기 반응식 1에서, R_1 및 R_2 는 상기에서 정의된 바와 같다.

청구항4

제 1 항의 5-피리미딘카르복스아미드 유도체 및/또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 유효 성분으로 함유하는 B형 간염 치료제 또는 예방제용 약학적 조성물.

청구항5

제 1 항의 5-피리미딘카르복스아미드 유도체 및/또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 유효 성분으로 함유하는 후천 성 면역 결핍증 치료제 또는 예방제용 약학적 조성물.